

◆胃がん◆

レジメン名	1コースの日数	予定コース	使用抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	支持療法薬剤	点滴所要時間
イリノテカン	14日	PDまで	イリノテカン	150m g / m ²	点滴	day1	day1 [*] ラニセトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 115分
CDDP+S-1	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day8 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day9.10 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day9-11 [*] キサメタゾ [*] N day8 [*] パ [*] ロ/セトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day8 225分
			シスプラチン	60m g / m ²	点滴	day8		
CDDP+S-1+ハーセプチン (初回)	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day2-4 [*] キサメタゾ [*] N day1 [*] パ [*] ロ/セトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 315分
			ハーセプチン	8m g / Kg	点滴	day1		
			シスプラチン	60m g / m ²	点滴	day1		
CDDP+S-1+ハーセプチン (2回目以降)	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day2-4 [*] キサメタゾ [*] N day1 [*] パ [*] ロ/セトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 255分
			ハーセプチン	6m g / Kg	点滴	day1		
			シスプラチン	60m g / m ²	点滴	day1		
CDDP+ゼローダ+ハーセプチン (初回)	21日	PDまで	ゼローダ	2000m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day2-4 [*] キサメタゾ [*] N day1 [*] パ [*] ロ/セトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 315分
			ハーセプチン	8m g / Kg	点滴	day1		
			シスプラチン	60m g / m ²	点滴	day1		
CDDP+ゼローダ+ハーセプチン (2回目以降)	21日	PDまで	ゼローダ	2000m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day2-4 [*] キサメタゾ [*] N day1 [*] パ [*] ロ/セトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 255分
			ハーセプチン	6m g / Kg	点滴	day1		
			シスプラチン	60m g / m ²	点滴	day1		
SOX	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] ア [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] ア [*] レビ [*] タント80m g、 day1 [*] グ [*] ラニセトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 145分
			オキサリプラチン	130m g / m ²	点滴	day1		
S-1+DOC	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] グ [*] ラニセトロン+ [*] キサメタゾ [*] N	day1 85分
			ドセタキセル	40m g / m ²	点滴	day1		
WeeklyPAC+RAM	28日	PDまで	パクリタキセル	80m g / m ²	点滴	day1.8.15	day1.8.15 [*] グ [*] ラニセトロン+ [*] キサメタゾ [*] N + [*] ポ [*] ララミン+ [*] ファモチジン	day1.15 175分
			サイラムザ	8m g / Kg	点滴	day1.15		day8 85分
RAM	14日	PDまで	サイラムザ	8m g / Kg	点滴	day1	day1ポララミン	day1 100分

WeeklyPAC	28日	PDまで	パクリタキセル	80m g / m ²	点滴	day1.8.15	day1.8.15 [*] ラニセトロン+テ [*] キサメタゾ [*] ン +ホ [*] ララミン+ファモチジ [*] ン	day1.8.15 100分
Weeklyアブラキサン+RAM	28日	PDまで	アブラキサン	100m g / m ²	点滴	day1.8.15	day1.15 [*] ホ [*] ララミン+テ [*] キサメタゾ [*] ン	day1.15 145分
			サイラムザ	8m g / Kg	点滴	day1.15	day8 [*] キサメタゾ [*] ン	day8 70分
XELOX	21日	PDまで (術後8コース)	ゼローダ [*]	2000m g / m ²	経口	day1-14	day1 [*] 7 [*] レビ [*] タント125m g、 day2.3 [*] 7 [*] レビ [*] タント80m g、 day1 [*] ラニセトロン+テ [*] キサメタゾ [*] ン	day1 145分
			オキサリプラチン	130m g / m ²	点滴	day1		
アブラキサン+ハーセプチン (初回)	21日	PDまで	アブラキサン	260m g / m ²	点滴	day1	day1 [*] キサメタゾ [*] ン	day1 155分
			ハーセプチン	8m g / Kg	点滴	day1		
アブラキサン+ハーセプチン (2回以降)	21日	PDまで	アブラキサン	260m g / m ²	点滴	day1	day1 [*] キサメタゾ [*] ン	day1 95分
			ハーセプチン	6m g / Kg	点滴	day1		
アブラキサン (weekly)	28日	PDまで	アブラキサン	100m g / m ²	点滴	day1.8.15	day1.8.15 [*] キサメタゾ [*] ン	day1.8.15 65分
アブラキサン	21日	PDまで	アブラキサン	260m g / m ²	点滴	day1	day1 [*] キサメタゾ [*] ン	day1 65分
オブジーボ (2W)	14日	PDまで	オブジーボ	240m g / body	点滴	day1		day1 40分
オブジーボ (4W)	28日	PDまで	オブジーボ	480m g / body	点滴	day1		day1 40分