

◆乳がん◆

レジメン名	1コースの日数	予定コース	使用抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	支持療法薬剤	点滴所要時間
EC	21日	4コース	エピルピシン	90m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1ア <sup>レ</sup> ピ <sup>タ</sup> ント125mg、 day2.3ア <sup>レ</sup> ピ <sup>タ</sup> ント80m g、 day2-4テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup> 、 day1パ <sup>ロ</sup> セトロン+テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 80分
			エンドキサン	600m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1		
FEC	21日	4コース 術後療法6コース	エピルピシン	100m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1ア <sup>レ</sup> ピ <sup>タ</sup> ント125mg、 day2.3ア <sup>レ</sup> ピ <sup>タ</sup> ント80m g day2-4テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup> day1パ <sup>ロ</sup> セトロン+テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 95分
			エンドキサン	500m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1		
			5-FU	500m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1		
HAL+ハーセ <sup>プ</sup> チン (初回)	21日	PDまで	ハーセ <sup>プ</sup> チン	8m g /K g	点滴	day1	day1.8グ <sup>ラ</sup> ニセトロン+テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 125分
ハラヴェン	1.4m g /m <sup>2</sup>		点滴	day1.8	day8 30分			
HAL+ハーセ <sup>プ</sup> チン (2回目以降)	21日		ハーセ <sup>プ</sup> チン	6m g /K g	点滴	day1	day1.8グ <sup>ラ</sup> ニセトロン+テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 65分
ハラヴェン	1.4m g /m <sup>2</sup>		点滴	day1.8	day8 30分			
HAL	21日	PDまで	ハラヴェン	1.4m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1.8	day1.8グ <sup>ラ</sup> ニセトロン+テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 30分
WeeklyGEM	21日	PDまで	ゲムシタピン	1250m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1.8	day1.8テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1.8 55分
WeeklyPAC+ベバシズマブ	28日	PDまで	パクリタキセル	90m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1.8.15	day1.8.15ホ <sup>ラ</sup> ミン+7αエチジ <sup>ン</sup> +テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup> +グ <sup>ラ</sup> ニセトロン	day1.15 190分
			ベバシズマブ	10m g /Kg	点滴	day1.15		day8 100分
WeeklyVNR	21日	PDまで	ロゼウス	25m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1.8	day1.8テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1.8 80分
ア <sup>ブ</sup> ラキサン+ハーセ <sup>プ</sup> チン (初回)	21日	PDまで	ア <sup>ブ</sup> ラキサン	25m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 155分
			ハーセ <sup>プ</sup> チン	8m g /K g	点滴	day1		
ア <sup>ブ</sup> ラキサン+ハーセ <sup>プ</sup> チン (2回目以降)	21日		ア <sup>ブ</sup> ラキサン	260m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 95分
			ハーセ <sup>プ</sup> チン	6m g /K g	点滴	day1		
ア <sup>ブ</sup> ラキサン	21日	PDまで	ア <sup>ブ</sup> ラキサン	260m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 65分
カドサイラ	21日	PDまで (再発)	カドサイラ	3.6m g /K g	点滴	day1	day1テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1 115分
テセントリク+ア <sup>ブ</sup> ラキサン	28日	PDまで	テセントリク	840m g /body	点滴	day1.15	day1.8.15テ <sup>キ</sup> サメタゾ <sup>ン</sup>	day1.15 125分
			ア <sup>ブ</sup> ラキサン	100m g /m <sup>2</sup>	点滴	day1.8.15		day8 65分
パ <sup>ロ</sup> セトロン+ハーセ <sup>プ</sup> チン (初回)	21日	PDまで (再発)	ハーゼ <sup>タ</sup>	840m g /body	点滴	day1		day1 160分
			ハーセ <sup>プ</sup> チン	8m g /K g				

パージェタ+ハーセプチン（2回目以降）	21日	術後1年	パージェタ	420m g / m <sup>2</sup>	点滴	day1		day1 100分
			ハーセプチン	6m g / K g				
ハーセプチン（術後乳がん）初回	21日	術後1年間	ハーセプチン	8m g / K g	点滴	day1		day1 100分
ハーセプチン（術後乳がん）2回目以降	21日		ハーセプチン	6m g / K g	点滴	day1		day1 40分
再発乳がんDOC	21日	PDまで	ドセタキセル	60m g / m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1アブ レピ タント125m g、 day2.3アブ レピ タント80m g、 day2-4カイトリル+テ キサメタゾ ン、 day1グ ラネセトロン+テ キサメタゾ ン	day1 85分
術前術後乳がんDOC	21日	4コース	ドセタキセル	75m g / m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1アブ レピ タント125m g、 day2.3アブ レピ タント80m g、 day2-4カイトリル+テ キサメタゾ ン、 day1グ ラネセトロン+テ キサメタゾ ン	day1 85分
術前術後乳がんTC	21日	4コース	ドセタキセル	75m g / m <sup>2</sup>	点滴	day1	day1アブ レピ タント125m g、 day2.3アブ レピ タント80m g、 day2-4カイトリル+テ キサメタゾ ン、 day1グ ラネセトロン+テ キサメタゾ ン	day1 115分
			エンドキサン	600m g / m <sup>2</sup>	点滴	day1		