

◆大腸がん◆

レジメン名	1コースの日数	予定コース	使用抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	支持療法薬剤	点滴所要時間
FOLFIRI	14日	PDまで	イリノテカン	150m g / m ²	点滴	day1	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 160分
			レボホリナート	200m g / m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g / m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g / m ²	持続点滴	day1-3		day1～ 46時間
IRIS+ベバシズマブ	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 205分 (2回目以降175分⇒ 145分まで短縮可)
			ベバシズマブ	7.5m g / Kg	点滴	day1		
			イリノテカン	150m g / m ²	点滴	day1		
IRIS+ベクティビックス	28日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1.15アブ レ [®] タント125m g、 day2.3.16.17アブ レ [®] タント80m g、 day1.15グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1.15 185分
			ベクティビックス	6m g / Kg	点滴	day1.15		
			イリノテカン	100m g / m ²	点滴	day1.15		
IRIS	28日	PDまで	S-1	80m g / m ²	点滴	day1-14	day1.15アブ レ [®] タント125m g、 day2.3.16.17アブ レ [®] タント80m g、 day1.15グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1.15 115分
			イリノテカン	125m g / m ²	点滴	day1.15		
m-FLOFOX6	14日	PDまで	オキサリプラチン	85m g / m ²	点滴	day1	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 160分
			レボホリナート	200m g / m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g / m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g / m ²	持続点滴	day1-3		day1～ 46時間
SOX+ベバシズマブ	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 235分 (2回目以降205分⇒ 175分まで短縮可)
			ベバシズマブ	7.5m g / Kg	点滴	day1		
			オキサリプラチン	130m g / m ²	点滴	day1		
SOX+ベクティビックス	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 215分
			ベクティビックス	6m g / Kg	点滴	day1		
			オキサリプラチン	130m g / m ²	点滴	day1		
SOX	21日	PDまで	S-1	80m g / m ²	経口	day1-14	day1アブ レ [®] タント125m g、 day2.3アブ レ [®] タント80m g、 day1グ ラニセロン+デ キサメタゾ [®] ン	day1 145分
			オキサリプラチン	130m g / m ²	点滴	day1		

S-1+ベバシズマブ	21日	PDまで	S-1	80m g /m ²	経口	day1-14		day1 100分 (2回目以降70分⇒40分まで短縮可)
			ベバシズマブ	7.5m g /Kg	点滴	day1		
S-1+ベクティビックス	21日	PDまで	S-1	80m g /m ²	経口	day1-14	day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 85分
			ベクティビックス	6m g /Kg	点滴	day1		
XELOX+ベバシズマブ	21日	PDまで	ゼローダ	2000m g /m ²	経口	day1-14	day1 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 235分 (2回目以降205分⇒175分まで短縮可)
			ベバシズマブ	7.5m g /Kg	点滴	day1		
			オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	day1		
XELOX	21日	PDまで (再発) 術後8コース	ゼローダ	2000m g /m ²	経口	day1-14	day1 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 145分
			オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	day1		
XELOX+ベクティビックス	21日	PDまで	ゼローダ	2000m g /m ²	経口	day1-14	day1 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 215分
			ベクティビックス	6m g /Kg	点滴	day1		
			オキサリプラチン	130m g /m ²	点滴	day1		
ベバシズマブ+FOLFIRI	14日	PDまで	ベバシズマブ	5m g /Kg	点滴	day1	day1 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 250分 (2回目以降220分⇒190分まで短縮可)
			イリノテカン	150m g /m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200m g /m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g /m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g /m ²	持続点滴	day1-3		
ベバシズマブ+m-FLOFOX6	14日	PDまで	ベバシズマブ	5m g /Kg	点滴	day1	day1 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 250分 (2回目以降220分⇒190分まで短縮可)
			オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200m g /m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g /m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g /m ²	持続点滴	day1-3		
イリノテカン	14日	PDまで	イリノテカン	150m g /m ²	点滴	day1	day1 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1 115分
イリノテカン+ベバシズマブ	28日	PDまで	イリノテカン	150m g /m ²	点滴	day1.15	day1.15 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3.16.17 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1.15 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1.15 205分 (2回目以降175分⇒145分まで短縮可)
			ベバシズマブ	5m g /Kg	点滴	day1.15		
イリノテカン+サイラムザ	28日	PDまで	サイラムザ	8m g /Kg	点滴	day1.15	day1.15 ^g ア ^g レ ^g タント125m g、 day2.3.16.17 ^g ア ^g レ ^g タント80m g、 day1.15 ^g ラニセトロン+ ^テ キサメタ ^g ン	day1.15 205分
			イリノテカン	150m g /m ²	点滴	day1.15		

イリノテカン+ベクティビックス	28日	PDまで	ベクティビックス	6m g/Kg	点滴	day1.15	day1.15アブ レビ タント125m g、 day2.3.16.17アブ レビ タント80m g、 day1.15ゲ ラニセトロン+デ キサメタジソン	day1.15 205分
			イリノテカン	120m g/m ²	点滴	day1.15		
キイトルーダ	21日	PDまで	キイトルーダ	200m g/body	点滴	day1		day1 40分
サイラムザ +FOLFIRI	14日	PDまで	サイラムザ	8m g/Kg	点滴	day1.15	day1アブ レビ タント125m g、 day2.3アブ レビ タント80m g、 day1ゲ ラニセトロン+デ キサメタジソン	day1 235分 day1~ 46時間
			イリノテカン	150m g/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g/m ²	持続点滴	day1-3		
ベクティビックス +FOLFIRI	14日	PDまで	ベクティビックス	6m g/Kg	点滴	day1.15	day1アブ レビ タント125m g、 day2.3アブ レビ タント80m g、 day1ゲ ラニセトロン+デ キサメタジソン	day1 230分 day1~ 46時間
			イリノテカン	150m g/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g/m ²	持続点滴	day1-3		
ベクティビックス+m-FLOFOX6	14日	PDまで	ベクティビックス	6m g/Kg	点滴	day1.15	day1アブ レビ タント125m g、 day2.3アブ レビ タント80m g、 day1ゲ ラニセトロン+デ キサメタジソン	day1 230分 day1~ 46時間
			オキサリプラチン	85m g/m ²	点滴	day1		
			レボホリナート	200m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	400m g/m ²	点滴	day1		
			5-FU	2400m g/m ²	持続点滴	day1-3		
ロンサーフ+ベバシズマブ	28日	PDまで	ロンサーフ	70m g/m ²	点滴	day1-5.6-12		day1.15 100分 (2回目以降70分⇒ 40分まで短縮可)
			ベバシズマブ	5m g/Kg	点滴	day1.15		